

# Quelle est la meilleure pondeuse plein-air?

**Dans le cadre d'un projet de l'UE intitulé «LowInputBreeds», des spécialistes de Hollande, de France et de Suisse ont investigué pour répondre à la question: quelle pondeuse est particulièrement adaptée pour la production biologique et la garde en plein-air? Dans la première phase de cette étude, les données d'exploitations biologiques et conventionnelles avec sorties en plein-air ont été enregistrées en Hollande, en Suisse et en France.**

276 exploitations ont participé à ces relevés. La plus grande partie des exploitations hollandaises et suisses sont biologiques, les autres pratiquent la ponte au sol ou en volières avec sorties. En France, ce sont essentiellement des exploitations conventionnelles avec libre parcours.

En général, ce sont les hybrides bruns qui ont la préférence; en France, il n'y a que des hybrides bruns. Les troupeaux de blanches sont plus fréquents en Suisse, comme les troupeaux mélangés de brunes et de blanches. En Hollande, les pondeuses Silver (plumes blanches, œufs bruns) ont la préférence.

En Hollande, la faible production d'œufs et le taux de mortalité élevé surprennent. En France par contre, les pondeuses ont le bec raccourci, ce qui pourrait expliquer la différence.

Les pondeuses blanches s'adaptent aussi bien à la production conventionnelle qu'à la production biologique en plein-air: La production d'œufs est plus élevée et la mortalité plus faible qu'avec les pondeuses brunes et les pondeuses Silver. Les poules blanches conviennent donc tout aussi bien à la production biologique qu'à la détention en plein-air. Prétendre que les pondeuses Silver

sont particulièrement adaptées pour les exploitations biologiques ne se confirme pas dans cette analyse. Les troupeaux mélangés, brunes et blanches, avec libre parcours ne réalisent pas une production plus élevée, mais la mortalité est inférieure. Par contre, dans les exploitations bio, aussi bien la production que la mortalité sont plus élevées.

Concernant la qualité du plumage, les troupeaux sont nombreux, brunes comme blanches, à être classées dans la catégorie «pas de bêtes déplumées»; il y a très peu de troupeaux dans la catégorie «plus de 25 % de bêtes déplumées». Chez les pondeuses Silver, il y a nettement plus de troupeaux classés dans la catégorie de plumage la plus mauvaise.

Dans la prochaine étape de cette étude, 40 exploitations bio et plein-air par pays seront observées en détail, notamment concernant les performances, la santé des bêtes et le management.

*Veronika Maurer, Institut de recherche de l'agriculture biologique, FiBL, Frick* ■

*A la page 17 de la version allemande, des tableaux et graphiques bilingues avec les résultats sont publiés.*