

# Règles d'hygiène dans la production d'œufs et de volaille

## Nettoyage et désinfection du poulailler après le changement de série

- Sortir le fumier du poulailler immédiatement après le départ des animaux, puis nettoyer le poulailler à sec
- Laver minutieusement le poulailler, les équipements, le jardin d'hiver, puis les désinfecter correctement
- Laver et désinfecter ou nettoyer les places devant le poulailler ainsi que les alentours du poulailler
- Nettoyer et désinfecter les silos à aliment 1x par année

## Installer et entretenir un sas d'hygiène

- Barrière d'hygiène dans le local de service du poulailler avec une séparation claire entre la zone «propre» («zone d'hygiène») et la zone «sale» («zone extérieure») → voir schéma
- Accès à l'aire à climat extérieur uniquement en passant par le sas d'hygiène
- Changer chaque semaine la solution désinfectante dans le bac de désinfection
- Nettoyer et désinfecter régulièrement le sol du local de service, en particulier après y avoir amené des appareils/du matériel ou après la visite de personnes étrangères à l'exploitation

## Contrôler l'accès au poulailler

- Qui doit / peut entrer dans le poulailler? La personne a-t-elle été dans d'autres exploitations avicoles?
- Changement de vêtements et de bottes également pour le personnel auxiliaire lors de la mise en place, de la vaccination et des chargements partiels

## En entrant dans le poulailler:

- Accès exclusivement par le sas d'hygiène → voir schéma
- Mettre des bottes faisant partie de l'équipement propre au poulailler (→ seul un changement de chaussures est sûr du point de vue hygiénique!)
- Revêtir des survêtements et un couvre-chef
- Se laver et se désinfecter les mains

## Contrôler le flux des marchandises

- Désinfecter les roues des véhicules, les appareils et les matériaux lorsqu'ils passent la barrière d'hygiène (→ en particulier s'ils viennent d'autres exploitations avicoles!)
- Utiliser si possible les outils faisant partie de l'équipement propre au poulailler

## Lutter contre les nuisibles

- Surveillance et lutte contre les souris, les rats, les insectes et les acariens dans le poulailler
- Rendre l'aire à climat extérieur aussi inaccessible et peu attractive que possible pour les oiseaux et les rongeurs


## Ordre et propreté autour du poulailler

- Pas de cachettes ni de nourriture pour les oiseaux et les rongeurs autour du poulailler (pas de machines, de buissons, de restes d'aliment près des silos, ni de fumier ou de cadavres)
- Maintenir les alentours immédiats du poulailler sans herbe, propres et secs (par ex. bandes de gravier d'1 m là où le sol n'est pas consolidé)

## Maintenir à distance les animaux sauvages et les animaux domestiques

- Ne pas laisser les chiens et les chats entrer dans le poulailler
- Pas de volaille d'ornement sur l'exploitation
- Ne pas laisser pâturer les volailles avec d'autres animaux de rente à proximité immédiate du poulailler
- Pas de mangeoires, d'abreuvoirs ni de surfaces d'eau ouvertes sur le pâturage
- Stocks de litière (par ex. balles de paille) si possible inaccessibles aux rongeurs et aux oiseaux

## Exemple d'un sas d'hygiène dans le local de service



## Remarques

Dans l'exemple, le bac de désinfection placé dans la zone d'hygiène sert à désinfecter les bottes de poulailler (nettoyées) après utilisation (le produit de désinfection peut ainsi agir plus longtemps). Un deuxième bac de désinfection se trouve dans la zone extérieure et sert à désinfecter les chaussures personnelles en entrant et en quittant le poulailler.

La barrière d'hygiène peut également être placée devant la porte menant au secteur où se tiennent les animaux. Avantage: accès plus facile aux équipements dans le local de service (systèmes de commande, ramassage des œufs etc.); désavantage: surface «sale» plus grande et risque plus élevé que de la poussière contaminée passe du local de service au secteur où se tiennent les animaux.